

**Tableau : Liste des outils Intervention préventive relative aux ITSS**

Outil		Objectifs	Nouveautés 2014 et commentaires
Intervention préventive relative aux ITSS • Visite initiale et counseling prétest • Visite subséquente et counseling post-test		Présenter les éléments à considérer au moment de la visite initiale et de la visite subséquente. Permettre de colliger les renseignements recueillis et les interventions réalisées.	Accessibles dans certains dossiers médicaux électroniques ou sous forme de bloc-notes, en version française et anglaise
Renseignements complémentaires		Présenter différents renseignements pour faciliter l'intervention préventive relative aux infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS).	Mise à jour des sites internet, guides de pratique et outils proposés Harmonisation du texte de la section <i>Intervention préventive auprès des personnes atteintes d'une ITS et auprès de leurs partenaires</i> (IPPAP) avec l'outil <i>Les partenaires sexuels, il faut s'en occuper!</i>
DÉPISTAGE	ITSS à rechercher selon les facteurs de risque décelés	Guider le choix des infections à rechercher dans le contexte du dépistage des ITSS.	Ajout/retrait de catégories : • avoir un nouveau partenaire sexuel ou plus d'un concurrentement • être incarcérée ou l'avoir été • recevoir des services dans un centre de ressources en dépendance à des drogues • être un jeune de la rue : catégorie retirée  Nouvelles indications de dépistage pour : • l'infection gonococcique (dont les femmes de 25 ans et moins) • l'hépatite C (HARSAH vivant avec le VIH)  Précisions concernant certaines indications : • multiples partenaires • diagnostic d'ITSS • utilisation de drogues par injection ou par inhalation, même si une seule fois • origine d'une région où les ITSS sont endémiques • demande de dépistage après un counseling prétest, même en l'absence de facteur de risque dévoilé
	Prélèvements et analyses recommandés en fonction de l'infection recherchée chez les personnes asymptomatiques (dépistage)	Guider le choix des prélèvements à faire et des analyses à demander dans le contexte du dépistage des ITSS.	Mise à jour du délai minimal et de la période fenêtre pour toutes les ITSS Infection à <i>Chlamydia trachomatis</i> et infection gonococcique : • analyse à privilégier : TAAN de façon générale, culture pour l'infection gonococcique dans certaines situations ou pour certains sites • précision selon les sites de prélèvements : recommandations spécifiques pour le dépistage au niveau de la gorge et de l'anus  Hépatite C : • selon le statut sérologique, dépistage avec l'anti-VHC ou l'ARN du VHC
COUNSELING	Estimation du risque associé aux activités sexuelles	Soutenir l'évaluation du risque associé à diverses activités sexuelles et le counseling visant l'adoption de comportements sécuritaires.	Ajout concernant l'effet de la charge virale sur le risque de transmission du VIH (et conditions requises) Précision sur le risque de transmission du VHC
	Liste de dépliants et de brochures à l'intention des patients	Présenter les brochures et les dépliants à remettre aux personnes qui font l'objet d'une intervention préventive relative aux ITSS.	Retrait des brochures qui ne sont plus disponibles Mise à jour des sites internet et hyperliens
	Ressources - Intervention préventive relative aux ITSS	Présenter les différentes ressources destinées aux professionnels de la santé, au grand public et aux personnes atteintes d'une ITSS ainsi que les sites Internet pertinents.	Mise à jour des : • coordonnées et horaire des organismes • publications disponibles • sites Internet
VACCINATION	Vaccination et ITSS	Résumer les indications vaccinales en rapport avec la sexualité ou la consommation de drogues. Donner des précisions sur les vaccins gratuits.	Mise à jour des indications de vaccination, selon le <i>Protocole d'immunisation du Québec, 2014</i> : • Virus du papillome humain • Pneumocoque conjugué • Pneumocoque polysaccharidique • <i>Haemophilus influenzae</i> (ajout)
TRAITEMENT	Guides sur le traitement pharmacologique des ITSS	Soutenir la prise en charge du traitement pharmacologique des personnes atteintes d'une ITSS	Infections visées : • infection à <i>Chlamydia tr.</i> et infection à <i>Neisseria gon.</i> et cervicite mucopurulente, atteinte inflammatoire pelvienne, urétrite, épидидymite • condylomes • herpès génital • syphilis
IPPAP	Les partenaires sexuels, il faut s'en occuper!	Préciser le rôle des différents professionnels de la santé en lien avec l'intervention visant à joindre les partenaires sexuels. Proposer des pistes pour soutenir l'intervention à réaliser auprès de la personne infectée Permettre d'identifier les partenaires à joindre en fonction de la période de contagiosité.	Précision sur la période de contagiosité de la syphilis après le traitement Ajout de l'herpès génital et des condylomes Ajout d'une section « Comment préparer la personne atteinte à aviser ses partenaires »